

LAGARTA DO PINHEIRO PROCESSIONÁRIA

**Se vir lagartas como estas
não lhes toque!**

A processionária ou lagarta do pinheiro é o principal inseto desfolhador dos pinheiros e cedros em Portugal e o seu nome advém-lhe do facto de constituir longas procissões de lagartas que se dirigem das árvores para o solo, onde irão crisalidar.



FASE DE CRESCIMENTO

Lagartas do 1º e 2º estágio de crescimento (8-10 mm de comprimento)

Lagarta revestida por quitina (endurecedor) devido à evolução do 3.º para o 5.º estágio – período do Inverno

Estágio de borboleta (Junho a Setembro)

FORMA DE TRATAMENTO

TRATAMENTO QUÍMICO

- 1 - Tratamento em meados de Setembro/finais de Outubro
 - Químico
 - Inibidor de crescimento (diflubenzurão e a tebufenozida)
 - Biológico (*Bacillus thuringiensis*)
- 2 - Tratamento por microinjeção (Outubro) com princípios nutritivos e/ou substâncias fitossanitárias que incrementam a vitalidade para melhorar as capacidades defensivas da árvore.

TRATAMENTO MECÂNICO

- 1 - Extração mecânica dos ninhos (usar EPI - fato protetor, máscara partículas, luvas e óculos) e posterior queima dos mesmos na devidas condições de segurança;
- 2 - Colocação de cintas embebidas com cola inodora à base de poli-isolbutadieno, em torno da árvore para captura de lagartas a descer;
- 3 - Recolha de lagartas acumuladas ou em procissão no solo, recorrendo a vassoura com devido cuidado para evitar dispersão de pelos urticantes.
- 4 - Se for localizado o local de enterramento das lagartas, cavar de forma a expor as pupas formadas ou lagartas em processo de transformação;

ARMADILHAS

Armadilhas iscadas com feromonas sexuais, nas árvores para a captura dos machos.

SINTOMAS DE CONTACTO

- . Comichão
- . Pele e olhos vermelhos
- . Dificuldade em respirar

